

CUADRO I.1. *Estimativos de población indígena del último período prehispánico en diferentes regiones estudiadas mediante reconocimientos arqueológicos sistemáticos*

	<i>Tamaño estudio (km²)</i>	<i>Área ocupada último período (has)</i>	<i>Población estimada</i>	<i>Densidad de población (km²)</i>
Parque Tairona	90,8	217,4	1.087-2.174	12-24
Bajo Magdalena	5,5	18,8	94-188	17-34
Aburrá	98,3	545	2.725-5.450	28-55
Yacuanquer	73	287,4	1.437-2.874	24-48
Tierradentro	211	751	3.755-7.510	18-36
Sector occidental Alto Magdalena	187	1.300	6.500-13.000	29-57
Fúquene	60	195,2	976-1.952	16-33
Valle de Leyva	182	307,3	1.537-3.074	9-18
Cota-Suba	57,7	450,9	2.255-4.509	39-78

FUENTE: Langebaek y Dever (2009); Drennan y Boada (2006).

CUADRO I.2. *Estimativos de población humana después de la Conquista española en diferentes regiones estudiadas mediante reconocimientos arqueológicos sistemáticos*

	<i>Tamaño estudio (km²)</i>	<i>Área ocupada después de la Conquista (ha)</i>	<i>Densidad de población último período prehispánico (km²)</i>	<i>Área ocupada después de la Conquista (ha)</i>	<i>Densidad de población después de la Conquista (km²)</i>
Parque Tairona	90,8	217,4	12-24	5,9	0,3-0,6
Bajo Magdalena	5,5	18,8	17-34	2	2-4
Aburrá	98,3	545	28-55	413	21-42
Yacuanquer	73	287,4	20-40	35	2-4
Tierradentro	211	751	18-36	88,8	2-4
Fúquene	60	195,2	16-33	468	39-78
Valle de Leyva	182	307,3	9-18	996	27-54

FUENTE: elaboración del autor.

CUADRO 1.3. *Porcentaje de patologías en la muestra de 228 individuos estudiada en Tibanica*

<i>Enf. Period</i>	<i>Caries</i>	<i>Cálculo</i>	<i>Hipoplasia</i>	<i>Criba</i>	<i>Hiperostosis</i>	<i>Periostitis</i>
37%	46,9%	46,5%	14%	13,6%	15%	14%

FUENTE: elaboración del autor.